

Tableau. Phases 1 à 6 de la priorisation de la vaccination contre la COVID-19

Phase 1	1a Personnes à très haut risque d'exposition
	<ul style="list-style-type: none"> - Professionnels de la santé et personnel du secteur hospitalier (Personnes travaillant dans le secteur hospitalier) - Professionnels de la santé du secteur extrahospitalier (Médecins et professionnels de santé libéraux) - Personnel des structures d'hébergement pour personnes âgées (Personnel de santé et de soins des travaillant dans les CIPA, maisons de soins et réseaux d'aides et de soins) - Résidents des structures d'hébergement pour personnes âgées et personnes en situation de handicap vivant dans des structures d'hébergement agréées

Phase 2	2a Personnes hautement vulnérables en raison de leur âge
	Personnes à partir de l'âge de 75 ans, en commençant par les plus âgées
	2b Personnes hautement vulnérables en raison d'un état de santé préexistant
	<p>Trisomie 21, adultes</p> <p>Greffe d'organe solide, y compris personnes inscrits sur une liste d'attente</p> <p>Greffe de cellules souches hématopoïétiques, au cours des 6 premiers mois ou sous traitement immunosuppresseur</p> <p>Cancer et hémopathie maligne sous traitement (chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie)</p> <p>Déficits immunitaires congénitaux</p>

Phase 3	3a Personnes significativement vulnérables en raison de leur âge
	Personnes de 70 à 74 ans, en commençant par les plus âgées
	3b Personnes significativement vulnérables en raison d'un état de santé préexistant
	<p>Immunodéficience acquise</p> <ul style="list-style-type: none"> médicamenteuse : immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie au long cours à dose immunosuppressive infection à VIH avec des CD4 <200/mm3 asplénie, fonctionnelle ou non <p>Affection respiratoire chronique sévère</p> <ul style="list-style-type: none"> Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sévère, stade GOLD 3 et 4, groupe D* Mucoviscidose Fibrose pulmonaire chronique sévère Pathologie restrictive extrapulmonaire sévère sous assistance ventilatoire ou non

Asthme sévère non contrôlé (niveau 5 selon GINA)[§] corticodépendant (sous corticothérapie orale)

Maladie cardiovasculaire sévère :

insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV[#]

coronaropathie instable

cardiomyopathie

Déficit neuro-cognitif majeur (score MMS° ≤ 20)

Insuffisance rénale chronique dialysée

Cirrhose au stade B ou C de la classification de Child-Pugh

Obésité morbide (indice de masse corporelle ≥ 40 kg/m²)

Phase 4

4a Personnes modérément vulnérables en raison de leur âge

Personnes de 65 à 69 ans (en commençant par les plus âgées)

4b Personnes modérément vulnérables en raison d'un état de santé préexistant

Diabète avec ou sans insuline, avec complications cardio-neuro-vasculaires

Hypertension artérielle compliquée, avec séquelle d'accident vasculaire cérébral ou cardiopathie associée

Maladie neuromusculaire avec répercussions cliniques

Phase 5

5a Personnes âgées de 55 à 64 ans, en commençant par les plus âgées

5b Personnes qui présentent un état de santé qui peut les exposer à un risque majoré

Diabète équilibré, sans complication

Hypertension artérielle non compliquée

Obésité (indice de masse corporelle 30-40 kg/m²)

Phase 6

6a Catégories spécifiques de la population générale

Personnes précaires, vivant en collectivités, et non vaccinées antérieurement du fait de leur vulnérabilité

Autres personnes particulièrement exposées à l'infection du fait de leur activité

6b Population résidente générale

Population résidente générale de 16 à 54 ans, en commençant par les plus âgés, non vaccinée antérieurement du fait d'une vulnérabilité